PRÉS SALÉS MÉDITERRANÉENS : PRAIRIES SUBHALOPHILES THERMO-ATLANTIQUES

Directive Habitat

Code : 1410
Annexe I

Surface relative sur le site : 9,37%

Surface relative sur la partie terrestre : 12,01%

Etat de conservation : Bon

STATUT

AU NIVEAU EUROPEEN :
Habitat menacé, inscrit à l'Annexe I de la Directive Habitats

EN RÉGION POITOU-CHARENTES :
Valeur Patrimoniale Régionale : ✯✯✯
Menaces : ☹☹
Rareté : 3

SOUS-TYPES PRESENTS SUR LE SITE

« Prairie subhalophiles thermo-atlantiques » (**1410-3**) (COR 15.52).

REPARTITION SUR LE SITE

Cet habitat est présent sur l'ensemble du système prairial du site c'est-à-dire « marais plats », bossis, jas et baisses des autres cellules paysagères à l'exception des « Prés salés » et « Sartières »

Surface relative (en %) occupée par l'habitat « Prés salés méditerranéens : Prairies subhalophiles thermo-atlantiques » (1410-3) au sein des cellules paysagères.

Cellule paysagère	Surface relative (%)
Aquacole exploité	1,16
Aquacole non exploité	11,57
Marais à poissons	23,53
Marais plats	39,10
Mare cynégétique	0,86
Prés salés	absent
Sartières	absent

Baisse « hygrophile »

REPRÉSENTATIVITÉ SUR LE SITE

1312 hectares

CONNAÎTRE - EVALUER - GÉRER

PHYSIONOMIE - ECOLOGIE

La prairie subhalophile thermo-atlantique repose sur un sol argileux formé d'alluvions flandriennes que l'on appelle le « bri ancien bleu » caractéristique des grands marais arrière-littoraux.

Classiquement, la composition floristique de l'habitat varie suivant l'hydromorphie (bossis, jas, baisses), la salinité du sol et la gestion de la prairie (pâturage, fauche).

- Méso-hygrophile (bossis et marais plats) : *Carici divisae-Lolietum perennis* en prairies pâturées ou *Trifolio squamosi-Oenanthetum silaifolia* plutôt en prairies de fauche.
- Plus hydromorphe (bords de jas et baisses régulièrement en eau) : *Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae* ou *Ranunculo ophioglossifolii-Menthum pulegii* en cas de fort piétinement.
- Subsaumâtre plus marqué (marais plats) : *Alopecuro bulbosi-Juncetum gerardii*

A noter cependant que le *Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae et le Ranunculo ophioglossifolii-Menthum pulegii* n'ont pas été observés sur les parcelles prospectées.

A noter que les spartinaies localisées le long de la Seudre présentent une dynamique régressive en micro-falaises d'érosion et sont donc matérialisées par un fin liseré souvent discontinu n'excédant pas 3-4 mètres de large.

Pied de *Ranunculus ophioglossifolius*.

ESPECES INDICATRICES

Les espèces dominantes de cet habitat appartiennent aux familles des :

- **Poacées** : Vulpin bulbeux *Alopecurus bulbosus*, Ray grass anglais *Lolium perenne*, Gaudinie fragile *Gaudinia fragilis*, Orge faux-seigle *Hordeum secalinum*…
- **Cyperacées** : Laîche divisée *Carex divisa* pour la plus emblématique, Scirpe des marais *Eleocharis palustris,* Scirpe à une glume *Eleocharis uniglumis…*
- **Fabacées**, avec près de 10 espèces du genre *Trifolium* : Trèfle maritime *Trifolium squamosum,* Trèfle résupiné *Trifolium resupinatum*, Trèfle fraise *Trifolium fragiferum*
- **Apiacées** avec notamment l'Oenanthe à feuilles de silaus *Oenanthe silaifolia.*
- **Renonculacées :** Renoncule à feuilles d'Ophioglosse *Ranunculus ophioglossifolius*, Renoncule sarde *Ranunculus sardous*…

VALEUR BIOLOGIQUE ET ESPECES ASSOCIEES

La prairie subhalophile thermo-atlantique héberge un certain nombre d'espèces végétales à forte valeur patrimoniale. Ont ainsi été observées sur la rive droite en fond de marais :

- La Renoncule à feuilles d'Ophioglosse *Ranunculus ophioglossifolius*
- Le Trèfle de Micheli *Trifolium michelianum*
- Le Trèfle à faux-ornithope *Trifolium ornithopodioides*

Trèfle de Micheli

ETAT DE CONSERVATION - MENACES

L'état de conservation de cet habitat est bon. Deux menaces principales sont néanmoins présentes :

- Le surpâturage, ou l'artificialisation (sursemis de Grande fétuque, Ray grass anglais…) de ces prairies conduisent à un appauvrissement floristique, voire dans certains cas, à une modification de l'habitat si bien qu'il ne peut plus être considéré comme de la prairie subhalophile thermo-atlantique.
- Le retournement de la prairie ou son remblaiement sont des atteintes graves à l'habitat.

ELEMENTS DE GESTION

Respecter des techniques d'exploitation herbagère traditionnelle, en maintenant un système extensif. Éviter le surpâturage. Ne pas faucher avant la mi-juin. Ne pas amender les prairies. Ne pas pâturer, ni faucher du 15 décembre au 15 mars. Ne pas niveler, drainer, labourer la prairie.

SUIVI/ETUDES COMPLEMENTAIRES

Mise en place d'un suivi de l'état de conservation à long terme de cet habitat sur un réseau de parcelles prenant en compte la diversité des situations (amont/aval, rive gauche/ rive droite, gradient de proximité de l'estuaire).

Crédits photographiques : Marie-Charlotte SICOT, Jean TERRISSE, Tela Botanica

Réalisation :
Virginie BARRET **©SEPN LPO**
Gaëlle KANIA, - CCBM