

ANATIDÉS ET LIMICOLES MIGRATEURS




DESCRIPTION

Les limicoles rassemblent de nombreux petits échassiers migrateurs qui viennent hiverner sur les côtes atlantiques. Canards, oies, tadorne font partie de la famille des Anatidés. La plupart des espèces nichent dans les nord-est de l'Europe et hivernent dans les sud de l'Europe et l'Afrique occidentale.

DISTRIBUTION

Ces oiseaux, chassable pour la plupart, se regroupent dans quelques sites remarquables protégées. Leurs populations peuvent alors atteindre des seuils d'importance internationale et sont dès lors intégrées dans les problématiques de conservation de la directive Oiseaux.



OIE CENDRÉE
TADORNE DE BELON
CANARD COLVERT
CANARD CHIPEAU
CANARD PILET
CANARD SOUCHET
CANARD SIFFLEUR
SARCELLE D'HIVER
HUITRIER PIE
GRAND GRAVELOT
PLUVIER ARGENTÉ
PLUVIER DORÉ
BÉCASSEAU SANDERLING
CHEVALIER GAMBETTE
BARGE À QUEUE NOIRE
BARGE ROUSSE
COURLIS CENDRÉ
BÉCASSEAU MAUBÈCHE
BÉCASSEAU VARIABLE



Le marais de la Réserve de Moëze joue un rôle important pour l'alimentation et le repos de certaines



Le pâturage ovin ont un impact positif sur la capacité d'accueil des anatidés qui exploitent ce milieu pour leurs activités de repos et d'alimentation.

OBJECTIFS DE GESTION ET DE CONSERVATION

- Garantir de bonnes conditions d'hivernage et protéger notamment les sites de repos mais aussi des sites de gagnage.
- Eviter toute source de dérangement sur les reposoirs de marée haute traditionnels.
- Renforcer les capacités d'accueil de la réserve de Moëze-Oléron par la création d'une zone tampon sans chasse
- Préserver les prairies humides et avoir une gestion hydraulique adaptée aux enjeux écologiques
- Poursuivre des programmes de recherche visant à définir d'une manière précise l'occupation spatiotemporelle des canards en Marais de Brouage.



ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE SITE NATURA 2000 MARAIS DE BROUAGE, ILE D'OLERON

Période où le site fonctionnel Brouage-Oléron atteint des seuils internationaux pour ses effectifs de limicoles.


Site	Mois											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Marais de Brouage				R	R	R	R	R	R			




Effectif moyen hivernal recensé sur le site fonctionnel Brouage-Oléron et inventaire des espèces atteignant les critères Ramsar (2004-2010).

Espèce	Effectif	Seuil RAMSAR
Barge à queue noire	3802	x
Barge rousse	1319	x
Bécasseau maubèche	10097	x
Bécasseau sanderling	330	x
Bécasseau variable	27515	x
Canard chipeau	48	
Canard colvert	4986	
Canard pilet	103	
Canard siffleur	3314	
Canard souchet	65	
Chevalier gambette	408	
Courlis cendré	1462	
Grand gravelot	953	x
Huitrier pie	1575	
Oie cendrée	377	
Pluvier argenté	2395	x
Pluvier doré	90	
Sarcelle d'hiver	250	
Tadorne de Belon	7413	x


< 1 000	
Entre 1 000 < 3 000	
Entre 3 000 et < 5 000	
Entre 5 000 et < 10 000	
Entre 10 000 et < 20 000	
Entre 20 000 et > 20 000	
Critère 5 Ramsar	R




Localisation des anatidés en hiver en France (Source WI LPO/ONCFS 15/01/2010)



Evolution de la population hivernante d'Anatidés de 1986 à 2010 sur la réserve de Moëze-Oléron.



Evolution de la population hivernante de Limicoles de 1986 à 2010 sur la réserve de Moëze-Oléron



Stationnement du Bécasseau maubèche en France. (Source WI ONCFS 15/01/2010)

Crédits photographiques :
Xavier REBEYRAT, Philippe JOURDE, Sébastien BRUNET (LPO)

Rédaction et mise en page :
Philippe JOURDE, Xavier REBEYRAT